

# Lineamientos para mandar a su hijo a la escuela Según las recomendaciones del Departamento de Estado de Servicios de Salud de Texas

## **RESFRÍO, DOLOR DE GARGANTA, TOS**

Su niño **puede** asistir a la escuela cuando él / ella tiene TODO lo siguiente:

- tiene sólo síntomas leves de resfriado, o no hay síntomas de resfriado.
- Tiene una temperatura normal (menos de 100 grados) durante 24 horas o más.
- Tiene suficiente energía para hacer el trabajo escolar.
- Puede evitar la propagación de gérmenes al lavarse las manos, tirar los pañuelos de papel usados, toser en la manga / codo y toser lejos de otras personas.
- Ha estado tomando antibióticos durante **MÁS** de 24 horas (o no está tomando antibióticos).

Es posible que su hijo **NO** asista a la escuela cuando él / ella:

- Tiene fiebre (temperatura superior a los 100 grados) o necesita medicamentos para reducir la fiebre.
- Tiene glándulas inflamadas.
- Ha estado tomando antibióticos por menos de 24 horas.

## **FIEBRE, VÓMITOS Y DIARREA**

Si su hijo tiene fiebre (100 grados o más), está vomitando o tiene diarrea, debe quedarse en su casa . Su hijo debe estar libre de fiebre (menos de 100 grados) sin medicamentos para reducir la fiebre y sin vómitos ni diarrea durante 24 horas antes de regresar a la escuela.

## **OJOS ROJOS**

Mantenga a su hijo en casa si la parte blanca del ojo está roja, y se observan sustancias pegajosas amarillas, verdes o pegajosas en el ojo. Si su hijo tiene ojo rosado (conjuntivitis), debe quedarse en casa hasta que haya estado usando antibióticos para los ojos recetados por un médico, por 24 horas o más. El ojo rosado es extremadamente contagioso.

## **ERUPCIÓN**

Mantenga a su hijo en casa si tiene una erupción en una gran parte de su cuerpo o si la erupción está supurando. Las erupciones a veces pueden ser complicadas, por lo que si la enfermera de la escuela siente que es contagioso, enviaremos a su hijo a casa. Algunas erupciones también pueden necesitar ser diagnosticadas y tratadas por un médico.

## **HERIDAS**

Mantenga a su hijo en casa si él / ella tiene:

- Herida abierta, que está drenando.
- El área alrededor de la herida está roja, hinchada, sensible o caliente al tocar.
- Ha desarrollado fiebre junto con la herida.

Si su hijo tiene una pequeña herida que no drena, **debe** permanecer cubierta durante todo el día escolar. Si la enfermera de su escuela siente que la herida se está extendiendo o está empeorando, enviaremos a su hijo a casa y esto justificará una visita a un médico.